

Maxforce® Ultra

PROFIL SANITAIRE

CLASSIFICATION DE RISQUE CE:

Voir étiquette

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL:



ÉTIQUETTE PRODUIT (correcte au moment de l'impression)

Maxforce ultra, appât pour blattes aux stades adultes et larvaires, contient une matière active originale, l'hydraméthylnone, qui agit selon un mode d'action différent des insecticides conventionnels.

Maxforce ultra, insecticide prêt-à-l'emploi, sans odeur, non volatil, non répulsif, respecte l'utilisateur et l'environnement. Spécialement conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la désinsectisation.

MODE D'EMPLOI

Maxforce ultra contient une matière active l'hydraméthylnone appartenant à la famille Amidinohydrazone, qui agit sur les mécanismes de la respiration cellulaire. L'effet sur la population d'insectes est visible 2 à 3 jours après le traitement.

Maxforce ultra s'utilise de la façon suivante :

- Identifier l'endroit à traiter et déterminer les lieux d'agrégation et de passage des blattes.
- Placer Maxforce ultra à proximité des endroits identifiés mais aussi entre les sources de nourriture et les lieux d'agrégation.

Les lieux d'agrégation sont souvent des endroits sombres et humides (fissures, infractuosités, matériels électriques placés contre un mur, éviers, lavabos, gaines d'aération, etc.). Les lieux de passage sont généralement les plinthes, tuyaux, les gaines électriques, les bouches d'aération, etc.).

Les blattes se déplacent dans un immeuble par des accès tels que les canalisations et conduits techniques. Des appâts placés à ces endroits renforcent la réussite du traitement.

Maxforce ultra est introduit dans des endroits déterminés: fissures, infractuosités, rebords, en déposant une faible quantité de produit.

- Appliquer Maxforce ultra à l'aide du pistolet doseur Aventis. La mise en place de la cartouche Maxforce ultra sur le pistolet doseur s'effectue de la façon suivante:

1. Dévisser le bouchon de la cartouche.
2. Retirer le cache protecteur de la cartouche.
3. Insérer la cartouche Maxforce ultra dans le corps du pistolet en s'assurant que la pointe de la cartouche rentre dans l'orifice du pistolet.
4. Introduire le rebord plat de la cartouche dans la languette poussoir.
5. Fixer sur le pistolet l'embout en lui faisant faire 1/2 tour.
6. Sélectionner à l'aide de la molette la quantité de Maxforce ultra à appliquer. La position 2 permet d'appliquer une dose minimale de 0,01 g par point d'appâtage nécessaire pour une infestation moyenne sur petites blattes.
7. Appuyer sur la gachette jusqu'à ce que le Maxforce ultra apparaisse. Maxforce ultra est alors prêt à être appliqué.

Le gel ne doit pas être utilisé près d'aliments non couverts. Avant traitement, enlever de la zone infestée toute source naturelle d'alimentation pour les blattes (déchets, restes de nourriture, ...).

Les appâts sont alors plus attractifs et l'ingestion d'insecticide favorisée.

Déposer directement les points d'appâtage de gel sur les surfaces à traiter.

Appliquer le gel dans des endroits abrités et peu éclairés. Eviter les sites trop humides, poussiéreux ou gras.

Maxforce ultra doit être appliqué dans les coins, fissures, espaces creux, et sur les canalisations ou tuyaux non chauffés à proximité des éléments domestiques, réfrigérateurs, cuisinières, éviers, baignoires, etc.

Maxforce ultra est parfaitement adapté au traitement dans les lieux sensibles (restaurants, hôpitaux, écoles, garderies, etc.) et certains endroits spécifiques (à proximité d'équipements électriques, électroniques ou mécaniques) où l'emploi d'insecticides liquides conventionnels n'est pas recommandé.

DOSES D'EMPLOI:

ESPECES	DOSE g/m ²
Blattes germaniques et blattes rayées	0,250 - 0,50
Blattes orientales et américaines	0,50 - 1,00

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou chauffées (> 50° C). Le gel reste attractif pour les blattes en conditions normales d'utilisation environ 12 semaines. Maxforce ultra peut être intégré dans des programmes avec des traitements de volumes ou de surfaces, mais ne doit pas être contaminé par d'autres insecticides ou placé sur des surfaces fraîchement traitées.

Maxforce ultra peut être combiné avec plusieurs insecticides de la gamme Aventis E.S.: K-Othrine, Cislin, Aquapy etc.

RECOMMANDATIONS:

En cas de fortes infestations, quatre semaines après l'application du Maxforce ultra, vérifier à l'aide de pièges ou produits de débuscage si les blattes sont encore présentes; dans ce cas, répéter l'application si le gel a été consommé.

STOCKAGE:

Stocker hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Garder dans un endroit sec à une température supérieure à - 10° C et inférieure à 40° C. Dans ces conditions, Maxforce ultra se conserve pendant 4 ans.

Important: Respectez les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases les traitements selon la bonne pratique en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers qui peuvent intervenir et échappent à notre contrôle (matériels utilisés, conditions d'applications, mélange de produits, etc.). Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine.

PRECAUTIONS:

Il est déconseillé d'utiliser Maxforce ultra sur revêtements fragiles, tels que moquettes, tapisseries, marbre (risque de légère coloration du support traité).

S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S 13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S 20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

S 36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S 45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Après l'emploi de Maxforce ultra et avant les repas, se laver les mains et la peau avec de l'eau et du savon.

Ne pas appliquer le gel sur les surfaces où les aliments sont conservés, préparés ou consommés.

Protéger les aliments, les ustensiles de cuisine et les couverts de la contamination pendant l'application.

N'appliquer le gel que dans les endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux.

Toxique pour les poissons. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou les cartouches.

EMBALLAGES:

Ne se débarrasser de ce produit qu'en se conformant aux réglementations et en prenant les précautions d'usage.

Rendre inutilisable. Si le volume des déchets est inférieur ou égal à 1100 litres hebdomadaire, mettre à disposition des services de collecte des ordures ménagères. Si le volume des déchets est supérieur à 1100 litres hebdomadaire, trier et valoriser en recourant à un service de collecte spécifique.

De plus amples informations sur l'ensemble des produits Aventis Environmental Science pour le contrôle professionnel des nuisances liées aux insectes sont disponibles auprès de:

Aventis Environmental Science • 55 Avenue René Cassin • 69009 LYON • Tél: 04 72 85 43 85 • Fax: 04 72 85 43 39
ALWAYS READ THE LABEL. USE PESTICIDES SAFELY. Maxforce Ultra contient 2,15% d'hydraméthylnon.

® Maxforce Ultra est une marque déposée de Clorox Company, Etats-Unis. ® Marque déposée d'Aventis. © Copyright Aventis 2000. (AV/0003/2-00)